

THÔNG BÁO

**Về một số điểm mới trong danh mục thuốc không kê đơn
được quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 3/5/2017**

Kính gửi : Khoa lâm sàng

Ngày 3/5/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2017/TT-BYT về Ban hành danh mục thuốc không kê đơn, thay thế danh mục thuốc không kê đơn trước đây được quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Một số điểm thay đổi về Danh mục thuốc không kê đơn được quy định trong Thông tư 07/2017/TT-BYT so với trước đây như sau :

1. Nguyên tắc xây dựng và tiêu chí lựa chọn thuốc vào Danh mục thuốc không kê đơn :
bổ sung các nội dung

- Bảo đảm việc tiếp cận thuốc kịp thời cho người dân.
- Thuốc ít có nguy cơ bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng.
- Thuốc đã có thời gian lưu hành tại Việt Nam tối thiểu từ 05 năm trở lên.

1. Bỏ khỏi danh mục thuốc không kê đơn cũ hoạt chất sau :

- Dexibuprofen
- Diacerein
- *Domperidon*
- Ethylestradiol đơn chất và phối hợp Gestodene
- Ethylestradiol đơn chất và phối hợp Levonorgestrel
- Lysozym đơn chất hoặc phối hợp với Tocopherol, Nicotinate, Carbazochrom, Inositol, Cetylpyridinium, ...

2. Bổ sung thêm vào danh mục thuốc không kê đơn hoạt chất sau :

- Natri Hyaluronat (acid Hyaluronic) : dùng ngoài, *dung dịch nhỏ mắt với nồng độ $\leq 0,1\%$* (cũ : Natri Hyaluronat (acid Hyaluronic) : dùng ngoài)

3. Bổ sung điều kiện đối với một số thuốc đã có trong danh mục thuốc không kê đơn :

TT	Thành phần hoạt chất	Đường dùng, dạng bào chế, giới hạn hàm lượng, nồng độ	Các quy định cụ thể khác
46	Bismuth dạng muối	Uống: các dạng	Chỉ định điều trị chứng ợ nóng
69	Cimetidin	Uống: dạng chia liều với giới hạn hàm lượng Cimetidin $\leq 200\text{mg}/\text{đơn vị}$	Chỉ định điều trị chứng ợ nóng
83	Desloratadin	Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng $\leq 5\text{mg}/\text{đơn vị}$ chia liều Hoặc uống với liều tối đa 5mg/ngày	
185	Omeprazol	Uống: dạng đã chia liều với hàm lượng $\leq 10\text{mg}/\text{đơn vị}$	Với chỉ định ợ nóng. Chỉ được bán tối đa 1 lần không có đơn với số lượng cho 14 ngày sử dụng và liều mỗi ngày $\leq 20\text{mg}$
211	Ranitidin	Uống: các dạng đã chia liều $\leq 75\text{mg}$	Bán tối đa không có đơn cho 15 ngày sử dụng. Chỉ định điều trị chứng ợ nóng
238	Vitamin A và tiền Vitamin A (Betacaroten) dạng đơn thành phần và phối hợp với các vitamin	Uống: các dạng với giới hạn hàm lượng Vitamin A $< 5000 \text{ IU}/\text{đơn vị}$ Dùng ngoài Thuốc tra mắt	

Trân trọng./.

Trưởng Khoa Dược

Thân Thị Thu Vân