

THÔNG BÁO

Về nguy cơ nhiễm khuẩn vùng sinh dục hiếm gặp nhưng nghiêm trọng khi sử dụng thuốc ức chế đồng vận chuyển natri–glucose (SGLT2)

Kính gửi : Khoa lâm sàng

FDA cảnh báo một số trường hợp nhiễm khuẩn vùng sinh dục hiếm gặp nhưng nghiêm trọng đã được báo cáo liên quan đến sử dụng thuốc ức chế SGLT2 điều trị đái tháo đường typ 2.

Tình trạng này được gọi là **viêm mô hoại tử vùng đáy chậu hay hoại tử Fournier (Fournier's gangrene)**. FDA đang yêu cầu bổ sung cảnh báo về nguy cơ trên vào thông tin kê đơn của tất cả các thuốc ức chế SGLT2 và Hướng dẫn dành cho bệnh nhân.

Khuyến cáo dành cho bệnh nhân :

- Gọi hỗ trợ y tế ngay nếu xuất hiện một trong các triệu chứng như đau, đỏ, sưng bộ phận sinh dục hoặc khu vực từ bộ phận sinh dục hoặc đến trực tràng và có nhiệt độ cao hơn 38°C;
- Đọc kỹ Hướng dẫn cho bệnh nhân khi được kê đơn thuốc ức chế SGLT2 do có thể có các thông tin mới, quan trọng được bổ sung.

Khuyến cáo dành cho cán bộ y tế:

- Đánh giá bệnh nhân mắc hoại tử Fournier nếu có các biểu hiện của bệnh. Nếu nghi ngờ bệnh nhân mắc phản ứng có hại này, khởi đầu điều trị ngay bằng kháng sinh phổ rộng và phẫu thuật nếu cần thiết;
- Ngừng dùng thuốc ức chế SGLT2, theo dõi chặt chẽ nồng độ đường huyết và áp dụng biện pháp điều trị thay thế phù hợp để kiểm soát đường huyết.

FDA khuyến khích bệnh nhân và cán bộ y tế **báo cáo tác dụng có hại liên quan đến thuốc** cho cơ quan quản lý.

*** Thuốc SGLT2 hiện có tại Viện Tim : Dapagliflozin (Forxiga), Empagliflozin (Jardiance)**

Trân trọng./.

Trưởng Khoa Dược

Thân Thị Thu Vân